

nell'ultimo anno, tra questi il 98,9% ha bevuto alcolici nello stesso periodo, il 58,9% ha fumato quotidianamente almeno una sigaretta, il 12,7% ha consumato cocaina e il 3,1% eroina.

Del totale dei soggetti intervistati, il 2,1% ha riferito l'uso di cocaina negli ultimi dodici mesi. Tra tali consumatori, l'uso di alcol negli ultimi dodici mesi è riferito dal 97,6% dei soggetti, mentre, il 73,8% riferisce di fumare quotidianamente sigarette, l'84,8% ha fatto uso di cannabis e il 14,6% ha consumato eroina.

Lo 0,4% dei soggetti con età compresa tra i 15 ed i 64 anni ha riferito di aver fatto uso almeno una volta negli ultimi dodici mesi di eroina. L'87,3% degli intervistati che hanno riferito di aver consumato la sostanza ha bevuto anche alcolici, il 66,7% ha fumato quotidianamente, il 76,8% ha consumato cannabis e circa la metà cocaina.

Tabella I.1.1: Distribuzione della prevalenza condizionata di policonsumatori nella popolazione generale 15-64 anni negli ultimi 12 mesi

Sostanze	Alcol	Tabacco (≥ sigaretta/die)	Cannabis	Cocaina	Eroina
Cannabis	98,9	58,9	-	12,7	3,1
Cocaina	97,6	73,8	84,8	-	14,6
Eroina	87,3	66,7	76,8	51,8	-

Fonte: Elaborazione sui dati IPSAD-Italia 2007-2008

cocaina	3,1%
3,1% anche eroina	- Consumatori di
cocaina:	84,8% anche
14,6% anche eroina	cannabis
- Consumatori di	76,8% anche
eroina	cannabis
51,8% anche	cocaina

I.1.2. Consumo di droga nelle scuole e tra i giovani (studio ESPAD)

I dati relativi alle prevalenze dei consumi di sostanze psicoattive, legali ed illegali, nella popolazione studentesca nazionale, sono stati estratti dallo studio ESPAD Italia, condotto nell'anno 20082. Attraverso l'auto-compilazione di un questionario anonimo, l'indagine campionaria ha lo scopo di monitorare e stimare la quota di studenti di 15-19 anni che riferisce di aver consumato sostanze psicoattive in specifici periodi di tempo: nella vita, nel corso dell'ultimo anno, nell'ultimo mese, frequentemente o quotidianamente.

Indagine nei giovani studenti 15-19 anni

Lo studio è stato condotto su un campione di oltre 400 scuole selezionate sull'intero territorio nazionale. La mancata adesione allo studio da parte di diversi istituti, in particolare nei centri urbani ad elevata densità abitativa, e a determinati percorsi didattici, non ha consentito il coinvolgimento di un campione rappresentativo di istituti didattici, essendo alcune aree geografiche poco rappresentate ed alcune tipologie di istituti sovra-rappresentati. I risultati di seguito riportati intendono quindi fornire un quadro generale ed indicativo del fenomeno nella popolazione studentesca italiana, sebbene non statisticamente rappresentativo di tutta la popolazione.

I.1.2.1 Consumi di eroina


L'eroina è stata consumata almeno una volta nella vita dal 2,1% degli studenti italiani intervistati, mentre l'1,3% riferisce di averne consumata nel corso dell'anno antecedente l'intervista. Lo 0,8% degli studenti italiani sostiene di aver assunto eroina almeno una volta nei 30 giorni antecedenti la compilazione del questionario, e per lo 0,3% si è trattato di utilizzarla frequentemente (10 o più volte negli ultimi 30 giorni).

Il 2,1% ha usato eroina almeno una volta
Lo 0,3% la consuma frequentemente

Il consumo di eroina almeno una volta nella vita da parte dei quindicenni e sedicenni risulta leggermente più elevato nei soggetti italiani di genere maschile, rispetto ai coetanei europei (2,2% vs 2,0%); più elevata la differenza tra le adolescenti italiane ed europee (1,8% vs 1,0%).


² "Lo studio Espad europeo e l'indagine Espad-Italia", Bollettino sulle Dipendenze – XXX N.1-2/2007.

Figura I.1.21: Consumo di eroina nella popolazione scolarizzata (una o più volte nella vita, negli ultimi 12 mesi, negli ultimi trenta giorni, consumo frequente)



Fonte: Elaborazione sui dati ESPAD Italia2008

Figura I.1.22: Consumo di eroina nella popolazione scolarizzata (una o più volte negli ultimi 12 mesi). Distribuzione per genere e classi d'età



Fonte: Elaborazione sui dati ESPAD Italia2008

Pur osservando un maggiore coinvolgimento dei maschi nel consumo di eroina durante l'anno, tra gli studenti più giovani di 15-17 anni le differenze di genere risultano inferiori a quelle rilevate tra gli studenti 18-19enni.


Se nel genere maschile i consumi rimangono sostanzialmente stabili nelle diverse classi di età, nel collettivo femminile si osserva un progressivo decremento delle prevalenze, in particolare dopo i 16 anni, passando da 1,1% delle 15enni ($m=1,6$) a 0,8% delle 18enni e delle 19enni ($m=1,7\%$ in entrambe le classi di età). Dai rapporti delle prevalenze d'uso maschili e femminili, le maggiori differenziazioni di genere si osservano proprio tra i soggetti di 18 e 19 anni, con valori del rapporto tra le prevalenze pari a 2 in entrambe le classi di età.

Secondo le indicazioni riportate dagli studenti contattati negli studi condotti dal 2000 al 2008, la percentuale di studenti che hanno assunto eroina una o più volte negli ultimi 12 mesi sembra in continua diminuzione per le femmine dal 2004, mentre meno accentuato sembra il trend per i maschi, che si arresta nel 2007.

Studenti che consumano eroina:
maggior
interessamento del
genere femminile
nelle fasce più
giovani rispetto a
quelle più adulte

Trend in
diminuzione
dell'uso di eroina
soprattutto nel
genere femminile

Figura I.1.23: Consumo di eroina nella popolazione scolarizzata (almeno una volta negli ultimi 12 mesi). Anni 2000 - 2008



Fonte: Elaborazione sui dati ESPAD Italia 2000 – 2008

Tavella I.1.2: Confronto dei dati 2007-2008 relativi alle prevalenze del consumo di eroina una o più volte negli ultimi 12 mesi - ESPAD


Eroina Genere	Anno		Variazione 2007 vs 2008	
	2007	2008	valore assoluto	valore %
Maschi	1,58	1,59	0,01	0,7
Femmine	1,2	1,0	0,2	-14,4
Totale	1,4	1,3	0,1	-7,9

Fonte: Elaborazione sui dati ESPAD Italia 2000 - 2008

Tra gli studenti che hanno riferito di aver assunto eroina almeno una volta negli ultimi 12 mesi, il consumo più diffuso risulta quello di tipo occasionale (da 1 a 5 volte), soprattutto tra le studentesse (60% contro il 48% dei maschi). Per il 26% dei maschi ed il 17% delle femmine si è trattato invece di consumare eroina più frequentemente (20 o più volte in 12 mesi).

Prevalente il consumo occasionale

Figura I.1.24: Distribuzione della frequenza di consumo fra i consumatori di eroina nella popolazione generale (almeno una volta negli ultimi 12 mesi)




Fonte: Elaborazione sui dati ESPAD Italia 2008

I.1.2.2 Consumi di cocaina

Nel corso dell'anno 2008, il 5,8% degli studenti italiani riferisce di aver assunto cocaina almeno una volta nella vita ed il 3,6% dichiara di aver consumato la sostanza nel corso dell'ultimo anno. Il consumo recente di cocaina, riferito ai 30 giorni antecedenti la somministrazione del questionario è stato dichiarato dall'1,8% degli studenti, mentre per lo 0,5% si è trattato di un uso frequente.

Il consumo di cocaina almeno una volta nella vita da parte dei quindicenni e sedicenni risulta leggermente più elevato nei soggetti italiani rispetto ai coetanei europei sia per quanto riguarda la cocaina nel complesso (3,4% vs 3,0% per i maschi e 2,5% vs 2,0% per le femmine) che i derivati (2,8% vs 2,0% per i maschi e 2,2% vs 1,0% per le femmine).


Figura I.1.25: Consumo di cocaina nella popolazione scolarizzata (una o più volte nella vita, negli ultimi 12 mesi, negli ultimi trenta giorni, consumo frequente)



Fonte: Elaborazione sui dati ESPAD Italia2008

In entrambi i generi, la contiguità con l'uso di cocaina aumenta al crescere dell'età: nel collettivo maschile, i consumatori passano dall'1,6% dei 15enni al 4,1% dei 17enni, al 5,4% dei 18enni ed al 9% circa dei 19enni. Tra le studentesse, le consumatrici di cocaina passano dall'1% delle 15enni al 2,2% delle 17enni, al 3,3% delle 18enni ed al 4,3% delle 19enni.

Figura I.1.26: Consumo di cocaina nella popolazione scolarizzata (una o più volte negli ultimi 12 mesi). Distribuzione per genere e classi d'età



Fonte: Elaborazione sui dati ESPAD Italia2008

Sostanzialmente al ribasso, sebbene con una certa variabilità, il trend del consumo di cocaina negli ultimi 12 mesi rilevato nei campioni intervistati. Dopo una

Il 5,8% ha usato cocaina almeno una volta nella vita


Lo 0,5% la usa frequentemente

Maggior prevalenza degli studenti maschi che consumano cocaina

Riduzione dei consumi di cocaina nel 2008 su valori simili al 2002

tendenza all'aumento nel triennio 2005-2007, il 2008 sembra caratterizzato da una contrazione dei consumi.

Figura I.1.27: Consumo di cocaina nella popolazione scolarizzata (almeno una volta negli ultimi 12 mesi). Anni 2000 - 2008



Fonte: Elaborazione sui dati ESPAD Italia2000 – 2008

Tabella I.1.3: Confronto dei dati 2007-2008 relativi alle prevalenze del consumo di cocaina una o più volte negli ultimi 12 mesi - ESPAD


Cocaina Genere	Anno		Variazione 2007 vs 2008	
	2007	2008	valore assoluto	valore %
Maschi	5,3	4,6	0,7	-12,8
Femmine	3,2	2,6	0,6	-18,3
Totale	4,2	3,6	0,6	-13,1

Fonte: Elaborazione sui dati ESPAD Italia2000 - 2008

Tra gli studenti consumatori di cocaina durante l'ultimo anno, il 18% dei maschi ed il 15% delle femmine ha utilizzato la sostanza 20 o più volte, mentre per il 59% dei consumatori di entrambi i generi si è trattato di un consumo occasionale (da 1 a 5 volte).

Forte presenza di consumo occasionale

Figura I.1.28: Distribuzione della frequenza di utilizzo fra i consumatori di cocaina nella popolazione scolarizzata (almeno una volta negli ultimi 12 mesi)




Fonte: Elaborazione sui dati ESPAD Italia2008

I.1.2.3 Consumo di cannabis

Il consumo di cannabis è stato sperimentato dal 31,5% degli studenti intervistati, quota che raggiunge il 24,2% se si considera il consumo annuale ed il 15,2% quando si fa riferimento agli ultimi 30 giorni (una o più volte). Il 2,7% della popolazione studentesca nazionale riferisce di aver quotidianamente consumato cannabinoidi.

Rispetto all'eroina e alla cocaina, il consumo di cannabis almeno una volta nella vita da parte dei quindicenni e sedicenni italiani risulta inferiore rispetto ai coetanei europei per entrambi i generi (19,0% vs 22,0% per i maschi e 14,6% vs 16,0% per le femmine).

Figura I.1.29: Consumo di cannabis nella popolazione scolarizzata (una o più volte nella vita, negli ultimi 12 mesi, negli ultimi trenta giorni, consumo giornaliero)




Fonte: Elaborazione sui dati ESPAD Italia 2008

Il consumo di cannabis risulta direttamente correlato all'età dei soggetti: tra i maschi, le prevalenze di consumo passano dall'11,1% dei 15enni al 40,1% dei 19enni, mentre tra le studentesse passano rispettivamente dal 7,6% al 29,2%.

Sia nel collettivo maschile che in quello femminile, le prevalenze dei consumatori aumentano progressivamente, soprattutto nel passaggio dai 15 ai 16 anni (16 anni: m=20,5%; f=15,5%) e dai 16 ai 17 anni (17 anni: m=29,9%; f=22,9%).

Figura I.1.30: Consumo di cannabis nella popolazione scolarizzata (una o più volte negli ultimi 12 mesi). Distribuzione per genere e classi d'età



Fonte: Elaborazione sui dati ESPAD Italia 2008

Il trend del consumo di cannabis negli ultimi 12 mesi, rilevato nei campioni intervistati nel 2008, indica una tendenza all'aumento dal 2007 più marcato per le

Il 31,5% degli studenti 15-19 anni ha usato cannabis almeno una volta nella vita

Il 2,7% la consuma quotidianamente


Maggior consumo tra studenti 19enni: 40,1%

Uso precoce: 20% dei maschi di 16 anni

Lieve aumento dei consumi di cannabis nel 2008 soprattutto nel genere femminile

femminile rispetto ai maschi, anche se non si superano i valori del 2006 e restando ben lontani dalle punte massime del 2002.

Figura I.1.31: Consumo di cannabis nella popolazione scolarizzata (almeno una volta negli ultimi 12 mesi). Anni 2000 - 2008



Fonte: Elaborazione sui dati ESPAD Italia 2000 - 2008


Per quanto riguarda la frequenza di assunzione, in entrambi i generi prevale il consumo occasionale di cannabis, circoscritto a 1-5 volte nel corso dell'anno ($f=54\%$; $m=43\%$). Il 31% del collettivo maschile, contro il 18% di quello femminile, riferisce di aver utilizzato cannabis più assiduamente, 20 o più volte nei dodici mesi antecedenti l'indagine campionaria.

Tabella I.1.4: Confronto dei dati 2007-2008 relativi alle prevalenze del consumo di cannabis una o più volte negli ultimi 12 mesi – ESPAD

Cannabis	Anno		Variazione 2007 vs 2008		
	Genere	2007	2008	valore assoluto	valore %
Maschi		26,9	27,6	0,6	2,4
Femmine		19,1	20,4	1,3	6,9
Totale		23,0	24,2	1,2	5,3

Fonte: Elaborazione sui dati ESPAD Italia 2000 – 2008

Figura I.1.32: Distribuzione della frequenza di utilizzo fra i consumatori di cannabis nella popolazione scolarizzata (almeno una volta negli ultimi 12 mesi)



Fonte: Elaborazione sui dati ESPAD Italia 2008

I.1.2.4 Consumi di stimolanti


Il 4,7% della popolazione studentesca nazionale riferisce di aver provato sostanze stimolanti (amfetamine, ecstasy, GHB, ecc.) almeno una volta nella vita, mentre il 2,8% le ha utilizzate nel corso dell'ultimo anno. Il consumo recente di stimolanti nei 30 giorni antecedenti la compilazione del questionario e l'assunzione frequente, è stato riferito rispettivamente dall'1,5% e dallo 0,9% della popolazione studentesca nazionale.

Il 4,7% degli studenti 15-19 anni ha usato stimolanti almeno una volta nella vita

Lo 0,9% li usa frequentemente

Distinguendo tra tipologia di sostanza psicoattiva stimolante, si osserva una percentuale omogenea di consumatori di ecstasy e di amfetamine. Come osservato nell'indagine sulla popolazione in generale, anche in quella studentesca il consumo di stimolanti sembra essere meno diffuso in Italia rispetto alla media europea (ecstasy: 2,5% maschi italiani vs 4% maschi europei; 1,8% femmine italiane vs 3% femmine europee).

Figura I.1.33: Consumo di stimolanti nella popolazione scolarizzata (una o più volte nella vita, negli ultimi 12 mesi, negli ultimi trenta giorni, consumo frequente)




Fonte: Elaborazione sui dati ESPAD Italia 2008

In entrambi i generi, le quote dei consumatori di stimolanti aumentano al crescere dell'età dei soggetti ed in particolare tra gli studenti maschi, i quali passano dall'1,9% dei 15enni al 3,4% dei 17enni e al 6% dei 19enni.

Maggior consumo tra gli studenti maschi 19 anni: 6%

Tra le studentesse, pur osservando un aumento delle prevalenze di consumo all'aumentare dell'età delle consumatrici, i consumi tendono ad essere più contenuti, passando dall'1% delle 15enni al 2,1% delle 17enni, al 2,7% delle 19enni.

Figura I.1.34: Consumo di stimolanti nella popolazione scolarizzata (una o più volte negli ultimi 12 mesi). Distribuzione per genere e classi d'età




Fonte: Elaborazione sui dati ESPAD Italia 2008

Il trend del consumo di stimolanti negli ultimi 12 mesi rilevato nei campioni intervistati nel 2008 indica un decremento nei consumi per entrambi i generi. Questa variazione riscontrata nell'ultimo anno dovrà essere verificata mediante l'analisi congiunta di altre fonti informative. Se tale variazione verrà validata e confermata anche nei prossimi anni, potrebbe evidenziare un cambiamento nel profilo del consumo di sostanze nella popolazione scolarizzata.

Dopo tre anni di incremento diminuzione dei consumi di stimolanti nel 2008

Figura I.1.35: Consumo di stimolanti nella popolazione scolarizzata (almeno una volta negli ultimi 12 mesi). Anni 2003 - 2008



Fonte: Elaborazione sui dati ESPAD Italia 2000 – 2008


Tabella I.1.5: Confronto dei dati 2007-2008 relativi alle prevalenze del consumo di stimolanti una o più volte negli ultimi 12 mesi - ESPAD

Stimolanti Genere	Anno		Variazione 2007 vs 2008	
	2007	2008	valore assoluto	valore %
Maschi	4,0	3,6	0,4	-10,7
Femmine	2,3	2,1	0,2	-9,8
Totale	3,2	2,9	0,3	-10,4

Fonte: Elaborazione sui dati ESPAD Italia 2000 - 2008

Tra gli studenti intervistati consumatori di sostanze stimolanti, il 53% dei maschi ed il 58% delle femmine riferisce di aver utilizzato queste sostanze da 1 a 5 volte negli ultimi 12 mesi. Il consumo più assiduo di stimolanti (20 o più volte annualmente) è stato riferito rispettivamente dal 23% e dal 17% dalla popolazione studentesca maschile e femminile.

Figura I.1.36: Distribuzione della frequenza di utilizzo fra i consumatori di stimolanti nella popolazione generale (almeno una volta negli ultimi 12 mesi)




Fonte: Elaborazione sui dati ESPAD Italia 2008

I.1.2.5 Consumi di allucinogeni

Tra gli studenti italiani, il 4,7% ed il 2,9% ha riferito di aver usato sostanze allucinogene rispettivamente almeno una volta nella vita ed almeno una volta nel corso dell'anno 2008, mentre l'1,3% e lo 0,5% ha rispettivamente riportato di averne consumato recentemente (nel corso degli ultimi 30 giorni) e frequentemente.

Il 4,7% degli studenti 15-19 anni ha usato allucinogeni almeno una volta nella vita

Figura I.1.37: Consumo di allucinogeni nella popolazione scolarizzata (una o più volte nella vita, negli ultimi 12 mesi, negli ultimi trenta giorni, consumo frequente)




Lo 0,5% degli studenti usa frequentemente allucinogeni

Fonte: Elaborazione sui dati ESPAD Italia 2008

All'interno della popolazione studentesca nazionale, le prevalenze d'uso di sostanze allucinogene aumentano al passaggio da una classe di età alla successiva. Gli studenti maschi consumatori di allucinogeni rappresentano il 2,1% dei 15enni, il 3,5% dei 17enni ed il 5,8% dei 19enni; le studentesse consumatrici di tale tipologia di sostanze sono l'1,2% delle 15enni, l'1,9% delle 17enni ed il 2,5% delle 19enni.

Maggior uso tra studenti maschi 19 anni: 5,8%

Figura I.1.38: Consumo di allucinogeni nella popolazione scolarizzata (una o più volte negli ultimi 12 mesi). Distribuzione per genere e classi d'età




Fonte: Elaborazione sui dati ESPAD Italia 2008

Secondo le indicazioni rilevate dagli studenti intervistati dal 2003 al 2008 sembra delinearsi un aumento nel consumo di allucinogeni soprattutto nella popolazione scolarizzata maschile (Figura I.1.39).

Consumi in costante aumento dal 2005 confermato anche nel 2008

Figura I.1.39: Consumo di allucinogeni nella popolazione scolarizzata (almeno una volta negli ultimi 12 mesi). Anni 2003 - 2008



Fonte: Elaborazione sui dati ESPAD Italia 2000 – 2008


Tra gli studenti consumatori di allucinogeni, il 60% dei maschi ed il 67% delle femmine ne ha fatto uso da 1 a 5 volte nel corso dell'ultimo anno, mentre il consumo più frequente (20 o più volte nel corso di 12 mesi) è stato riferito dal 18% e dal 12% rispettivamente degli studenti e delle studentesse.

Tabella I.1.6: Confronto dei dati 2007-2008 relativi alle prevalenze del consumo di allucinogeni una o più volte negli ultimi 12 mesi - ESPAD

Allucinogeni Genere	Anno		Variazione 2007 vs 2008	
	2007	2008	valore assoluto	valore %
Maschi	3,6	3,8	0,2	5,7
Femmine	1,92	1,95	1,7	0,03
Totali	2,7	2,9	0,2	6,3

Fonte: Elaborazione sui dati ESPAD Italia 2000 - 2008

Figura I.1.40: Distribuzione della frequenza di utilizzo fra i consumatori di stimolanti nella popolazione generale (almeno una volta negli ultimi 12 mesi)



Fonte: Elaborazione sui dati ESPAD Italia 2008

I.1.2.6 Policonsumo nella fascia 15-19

La poliassunzione di sostanze psicoattive, legali ed illegali, caratterizza e

Forte tendenza al policonsumo:

definisce lo stile di consumo prevalente sempre più diffuso tra soggetti più giovani.

La Tabella I.1.7 rappresenta la distribuzione di prevalenza condizionata d'uso di sostanze legali ed illegali tra coloro che riferiscono di aver consumato sostanze illegali negli ultimi dodici mesi.

Il 24,2% degli studenti riferisce di aver consumato cannabis nell'ultimo anno, tra questi il 98,3% ha bevuto alcolici nello stesso periodo, il 68,4% ha fumato almeno una sigaretta al giorno, il 14,1% ha usato cocaina e il 4,4% eroina.

Degli studenti intervistati il 3,7% ha riferito l'uso di cocaina negli ultimi dodici mesi. Tra i consumatori di cocaina, l'uso di alcol negli ultimi dodici mesi è attribuibile al 98% dei soggetti, mentre, l'80,9% riferisce di fumare quotidianamente sigarette (prevalenza maggiore rispetto ai consumatori di cannabis), il 91,9% ha fatto uso anche di cannabis (per la quasi totalità dei soggetti si registra anche l'uso di tale sostanza) e il 23,6% di eroina.

L'1,3% ha riferito di aver fatto uso almeno una volta negli ultimi dodici mesi di eroina. Il 96,2% dei consumatori della sostanza ha consumato nello stesso periodo alcolici (prevalenza inferiore se confrontata con la stessa riferita dai consumatori di cannabis e cocaina), il 71,2% ha fumato quotidianamente, l'82,3% ha usato cannabis e il 66,7% cocaina.


Forte associazione
con alcol e tabacco
di tutte le sostanze
Consumatori di
cannabis:
14,1% anche
cocaina
4,4% anche eroina
Consumatori di
cocaina:
91,9% anche
cannabis
23,6% anche eroina
Consumatori di
eroina:
82,3% anche
cannabis
66,7% anche
cocaina

Tabella I.1.7: Distribuzione della prevalenza condizionata di policonsumatori nella popolazione scolarizzata negli ultimi 12 mesi (last year prevalence)


Sostanze	Alcol	Tabacco (≥ sigaretta/die)	Cannabis	Cocaina	Eroina
Cannabis	98,3	68,4	-	14,1	4,4
Cocaina	98,0	80,9	91,9	-	23,6
Eroina	96,2	71,2	82,3	66,7	-

Fonte: Elaborazione sui dati ESPAD 2007-2008

Figura I.1.41: Poliassunzione (dati ESPAD - età 15 – 19)



Fonte: Elaborazione sui dati ESPAD Italia 2008

Figura I.1.42: Poliassunzione (dati IPSAD - età 25–64 esclusa classe età 15-24)

Fonte: Elaborazione sui dati IPSAD-Italia 2007-2008

Tabella I.1.8: Confronto relativamente alla presenza di policonsumo tra le diverse classi: giovani (15-19) – ESPAD e adulti (25-64) IPSAD

Adulti 25 - 64 IPSAD	Alcol	Tabacco	Cannabis	Cocaina	Eroina
Cannabis	95,8	81,8	-	15,4	2,2
Cocaina	92,5	87,5	86,7	-	9,2
Eroina	94,1	76,5	88,2	64,7	-
Giovani 15-19 ESPAD					
Cannabis	98,3	68,4	-	14,1	4,4
Cocaina	98	80,4	91,4	-	23,6
Eroina	96,2	71,2	82,3	66,7	-
Differenze Assolute Giovani vs Adulti					
Cannabis	G>A 2,5	G<A -13,4	-	G<A -1,3	G>A 2,2
Cocaina	G>A 5,5	G<A -6,6	G>A 5,2	-	G>A 14,4
Eroina	G>A 2,1	G<A -5,3	G<A -5,4	G>A 2,0	-
Scostamento % (*) Giovani vs Adulti					
Cannabis	2,6	-16,3	-	8,6	97,7
Cocaina	5,9	-7,5	6,0	-	157,5
Eroina	2,2	-6,9	-6,7	3,1	-

(*) Denominatore = adulti

Fonte: Elaborazione sui dati IPSAD-Italia 2007-2008 e ESPAD Italia 2000-2008 –CNR -IFC


Tabella I.1.9: Confronto riepilogativo dei dati 2007 e 2008 relativi alle prevalenze del consumo di sostanze (eroina, cocaina, cannabis) negli ultimi 12 mesi nella popolazione giovanile 15-19 anni - ESPAD 2007-2008

Sostanze	Anno		Variazione 2007 vs 2008	
	2007	2008	valore assoluto	valore %
Eroina	1,4	1,3	0,1	-7,9
Cocaina	4,2	3,6	0,6	-13,1
Cannabis	23,0	24,2	1,2	5,3
Stimolanti	3,2	2,8	0,4	-10,4
Allucinogeni	2,7	2,9	0,2	6,3


Fonte: Elaborazione sui dati IPSAD-Italia 2007-2008 e ESPAD Italia 2000-2008 –CNR –IFC

Figura I.1.43: Uso di sostanze (una o più volte negli ultimi 12 mesi) secondo il genere nella popolazione generale (figura a sinistra) e nella popolazione scolarizzata (figura a destra)


EROINA



COCAINA




CANNABIS



Fonte: Elaborazione sui dati IPSAD-Italia 2007-2008 e ESPAD Italia 2000-2008 –CNR –IFC

Il confronto dei trend di consumo di eroina nella popolazione generale 15-64 anni – IPSAD e nella popolazione studentesca 15 – 19 anni ESPAD, mostra un differente andamento apparentemente incoerente. Nel primo caso, si assiste ad un aumento costante del trend dal 2001, confermato anche nel 2007/2008. Nel secondo caso, popolazione studentesca, invece si osserva una lieve diminuzione del trend tra il 2007 e il 2008. Analizzando ulteriormente il dato ed in particolare la distribuzione delle classi di età dell'archivio IPSAD (popolazione generale) con particolare attenzione alla classe giovanile 15-24, si osserva un incremento nel consumo di eroina, in contrapposizione con il dato ESPAD. Tale risultato trova spiegazione nel fatto che il consumo di oppiacei ha inizio prevalentemente in età adulta dai 20 anni in poi e nei casi precoci di età inferiore, la sostanza viene assunta da soggetti che sono già usciti dal circuito scolastico per abbandono o per un orientamento nel mondo del lavoro. Tale ipotesi conferma il dato differente tra le due fonti di indagine (popolazione generale e studentesca) e risulta avvalorata anche dal confronto con altre fonti sul consumo in generale fornito dall'analisi dei dati aggregati sulle segnalazioni delle Prefetture che evidenzia una diminuzione dei soggetti segnalati per uso di eroina in età giovane a fronte di un incremento delle segnalazioni tra gli adulti.


Figura I.1.44: Differenze della prevalenza di consumo di eroina una più volte negli ultimi 12 mesi nella popolazione generale per classi di età - Anni 2007 - 2008



Fonte: Elaborazione sui dati IPSAD-Italia 2007-2008 e ESPAD Italia 2000-2008 –CNR – IFC

Con riferimento al consumo di cocaina nella popolazione generale 15-64 anni – IPSAD e nella popolazione studentesca 15 – 19 anni ESPAD, il confronto dei trend analogamente al consumo di eroina evidenzia un differente andamento. Nella popolazione generale, si osserva un aumento costante del trend dal 2001, confermato anche nel 2007/2008. Nella popolazione studentesca, invece si osserva una diminuzione del trend tra il 2007 e il 2008. Dall'analisi approfondita della prevalenza per classi di età nella popolazione generale, con particolare attenzione alla classe giovanile 15-24, si riconferma, coerentemente con il dato ESPAD, una diminuzione della prevalenza del consumo tra il 2007 e il 2008. Per contro si osserva un incremento del consumo nelle classi più adulte 25-34, 35-44, 45-54, che peraltro hanno un “peso” superiore alla classe di età 15-24 anni in relazione alla numerosità più elevata. Questo potrebbe significare che nell'ultimo biennio si assiste ad un andamento differenziato del consumo di cocaina tra la popolazione giovanile 15-19-24 anni e le classi più adulte 24-64, dove invece aumenta con un inizio tardivo, quindi, dell'uso di cocaina.

Figura I.1.44: Differenze della prevalenza di consumo di cocaina una o più volte negli ultimi 12 mesi nella popolazione generale per classi di età - Anni 2007 - 2008



Fonte: Elaborazione sui dati IPSAD-Italia 2007-2008 e ESPAD Italia 2000-2008 –CNR – IFC

Tabella I.1.10: Prevalenza dell'uso di sostanze stupefacenti nella popolazione generale (15-64 anni) e popolazione scolarizzata (15-19 anni) – Anno 2008

POPOLAZIONE GENERALE						
Sostanza	NON USO (%)			USO (%)		
	una o più volte nella vita	ultimi 12 mesi	ultimi 30 gg	una o più volte nella vita	ultimi 12 mesi	ultimi 30 gg
Eroina	98,4	99,6	99,9	1,6	0,4	0,2
Cocaina	93,1	97,9	99,3	7,0	2,1	0,7
Cannabis	68,0	85,7	93,1	32,0	14,3	6,9
Stimolanti	96,2	99,3	99,8	3,8	0,7	0,2
Allucinogeni	96,5	99,4	99,8	3,5	0,7	0,2
POPOLAZIONE SCOLARIZZATA						
Sostanza	NON USO (%)			USO (%)		
	una o più volte nella vita	ultimi 12 mesi	ultimi 30 gg	una o più volte nella vita	ultimi 12 mesi	ultimi 30 gg
Eroina	97,9	98,7	99,2	2,1	1,3	0,8
Cocaina	94,2	96,4	98,2	5,8	3,7	1,9
Cannabis	68,5	75,8	84,8	31,5	24,2	15,2
Stimolanti	95,3	97,2	98,5	4,7	2,8	1,5
Allucinogeni	95,3	97,1	98,7	4,7	2,9	1,3

Fonte: Elaborazione sui dati IPSAD-Italia 2007-2008 e ESPAD Italia 2000-2008 –CNR – IFC