

Il confronto dei consumi di stupefacenti negli ultimi 10 anni evidenzia una progressiva contrazione dei consumi di eroina e cannabis, a fronte di un lieve aumento dei consumi di cocaina, in controtendenza dal 2007. Il consumo di stimolanti ha subito un forte incremento dal 2005 al 2007, stabilizzatosi nel periodo successivo, con una tendenza all'aumento osservato nel 2010. L'assunzione di sostanze allucinogene è cresciuta dal 2005 al 2008, in controtendenza nel 2010.

Tabella I.1.11: Consumo di sostanze stupefacenti nella popolazione scolarizzata 15-19 anni (almeno una volta negli ultimi 12 mesi). Anni 2000 - 2010

ANNO	Eroina	Cocaina	Cannabis	Allucinogeni	Stimolanti
2000	2,5%	3,4%	25,6%	n.d.	n.d.
2001	2,2%	3,6%	25,9%	n.d.	n.d.
2002	2,1%	3,6%	27,3%	n.d.	n.d.
2003	1,7%	3,6%	25,9%	2,2%	1,9%
2004	1,8%	3,9%	25,5%	2,4%	2,0%
2005	1,6%	3,4%	23,8%	2,1%	1,8%
2006	1,6%	3,9%	24,5%	2,4%	2,2%
2007	1,4%	4,2%	23,0%	2,8%	3,2%
2008	1,3%	3,6%	24,1%	2,9%	2,8%
2010	1,1%	3,0%	18,9%	2,2%	3,1%


n.d. dato non disponibile

Fonte: Elaborazione su dati ESPAD Italia 2000 – 2008, e dati SPS-ITA 2010

I.1.2.3 Consumi di eroina

L'eroina è stata consumata almeno una volta nella vita dall'1,2% degli studenti italiani intervistati, mentre lo 0,8% riferisce di averne consumata nel corso dell'anno antecedente l'intervista. Lo 0,6% degli studenti italiani sostiene di aver assunto eroina almeno una volta nei 30 giorni antecedenti la compilazione del questionario.

Figura I.1.26: Consumo di eroina nella popolazione scolarizzata 15-19 anni (una o più volte nella vita, negli ultimi 12 mesi, negli ultimi trenta giorni)



Fonte: Elaborazione su dati SPS-ITA 2010

Rispetto alla rilevazione del 2008, tutti i valori relativi al consumo di eroina da parte degli studenti italiani, risultano in diminuzione, e con particolare evidenza per il consumo una o più volte nella vita. Il consumo di eroina almeno una volta

Diminuzione dei consumi di eroina;


Il 98,8% degli studenti non ha mai assunto eroina, mentre l'1,2% ha usato eroina almeno una volta nella vita

Solo lo 0,6% l'ha consumata negli ultimi 30 giorni

Minor consumo di eroina degli studenti italiani rispetto agli studenti europei

nella vita da parte dei quindicenni e sedicenni risulta in diminuzione rispetto ai consumi medi europei osservati nell'ultima edizione dell'indagine ESPAD (2007), con particolare riferimento ai soggetti di genere maschile (1,5% vs 2,0%), e meno evidente rispetto alle coetanee europee (0,9% vs 1,0%).


Figura I.1.27: Consumo di eroina nella popolazione scolarizzata 15-16 anni (una o più volte nella vita), per genere. Europa 2007, Italia 2010



Fonte: Elaborazione su dati ESPAD 2007 e SPS-ITA 2010

Pur osservando un maggiore coinvolgimento dei maschi nel consumo di eroina durante l'anno precedente alla rilevazione, tra gli studenti più giovani di 15-17 anni le differenze di genere risultano inferiori a quelle rilevate tra gli studenti 17-19enni.

Figura I.1.28: Consumo di eroina nella popolazione scolarizzata 15-19 anni (una o più volte negli ultimi 12 mesi). Distribuzione per genere e classi d'età




Fonte: Elaborazione sui dati SPS-ITA 2010

Se nel genere maschile i consumi rimangono sostanzialmente stabili nelle età centrali considerate, nel collettivo femminile si osserva un progressivo decremento delle prevalenze, in particolare dopo i 17 anni, passando da 0,6% delle 17enni (m=1,3) a 0,5% delle 18enni (m=1,2) a 0,3% delle 19enni (m=1,8%). Dai rapporti delle prevalenze d'uso maschili e femminili, le maggiori differenziazioni di genere si osservano proprio tra i soggetti di 18 e 19 anni, con valori del rapporto tra le prevalenze pari a 2,4 per i 18-enni e 6,0 per i 19-enni.

Studenti che consumano eroina: maggior interessamento del genere femminile nelle fasce più giovani rispetto a quelle più adulte

Figura I.1.29: Consumo di eroina nella popolazione scolarizzata 15-19 anni (almeno una volta negli ultimi 12 mesi). Anni 2000 - 2010



Fonte: Elaborazione sui dati ESPAD Italia 2000 – 2008, e dati SPS-ITA 2010

Secondo le indicazioni riportate dagli studenti contattati negli studi condotti dal 2000 al 2010, la percentuale di studenti che hanno assunto eroina una o più volte negli ultimi 12 mesi sembra in continua diminuzione per le femmine dal 2004, mentre meno accentuato sembra il trend per i maschi. In questi ultimi si osserva, infatti, un trend decrescente per gli studenti dai 15 ai 18 anni, sebbene con una certa variabilità, a differenza dei 19enni, per i quali l'andamento decresce sino al 2006, anno in cui il trend inverte la sua direzione evidenziando un lieve aumento fino al 2010.


Trend in diminuzione dell'uso di eroina soprattutto nel genere femminile

Tabella I.1.12: Consumo di eroina nella popolazione scolarizzata 15-19 anni (almeno una volta negli ultimi 12 mesi). Confronto 2008 - 2010

Eroina	Anno		Variazione 2008 vs 2010		
	Genere	2008	2010	valore assoluto	valore %
Maschi		1,6	1,2	0,4	-25,0
Femmine		1,0	0,5	0,5	-50,0
Totale		1,3	0,8	0,5	-38,5

Fonte: Elaborazione su dati ESPAD Italia 2008 e SPS-ITA 2010

Figura I.1.30: Distribuzione della frequenza di consumo fra i consumatori di eroina nella popolazione scolarizzata 15-19 anni (almeno una volta negli ultimi 12 mesi)



Fonte: Elaborazione su dati SPS-ITA 2010

Tra gli studenti che hanno riferito di aver assunto eroina almeno una volta negli ultimi 12 mesi, il consumo più diffuso risulta quello di tipo occasionale (da 1 a 5 volte), soprattutto tra le studentesse (59% contro il 51% dei maschi). Per il 40% dei maschi ed il 28% delle femmine si è trattato invece di consumare eroina più frequentemente (20 o più volte in 12 mesi).

Prevalente il consumo occasionale

I.1.2.4 Consumi di cocaina


Nel 2010, il 4,1% degli studenti italiani riferisce di aver assunto cocaina almeno una volta nella vita ed il 2,9% dichiara di aver consumato la sostanza nel corso dell'ultimo anno. Il consumo recente di cocaina, riferito ai 30 giorni antecedenti la somministrazione del questionario è stato dichiarato dall'1,6% degli studenti.

Figura I.1.31: Consumo di cocaina nella popolazione scolarizzata 15-19 anni (una o più volte nella vita, negli ultimi 12 mesi, negli ultimi trenta giorni)

Diminuzione dei consumi di cocaina;


Il 95,9% degli studenti non ha mai assunto eroina, mentre il 4,1% ha usato cocaina almeno una volta nella vita

Solo l'1,6% l'ha consumata negli ultimi 30 giorni



Fonte: Elaborazione su dati SPS-ITA 2010

Figura I.1.32: Consumo di cocaina nella popolazione scolarizzata 15-16 anni (una o più volte nella vita), per genere. Europa 2007, Italia 2010



Fonte: Elaborazione su dati ESPAD 2007 e SPS-ITA 2010

Il confronto con gli ultimi dati disponibili a livello europeo (ESPAD 2007)


evidenzia che il consumo di cocaina almeno una volta nella vita da parte dei quindicenni e sedicenni risulta in linea con i consumi italiani per quanto riguarda la cocaina (2,9% vs 3,0% per i maschi e 2,1% vs 2,0% per le femmine), a fronte di valori più elevati per il crack (2,2% vs 2,0% per i maschi e 1,2% vs 1,0% per le femmine).

Con particolare riferimento al genere maschile, la contiguità con l'uso di cocaina aumenta al crescere dell'età: i consumatori passano dall'1,6% dei 15enni al 3,4% dei 17enni, al 4,5% dei 18enni ed al 6,6% dei 19enni. Tra le studentesse, l'aumento è meno marcato; le consumatrici di cocaina passano dall'1,2% delle 15enni all'1,8% delle 17enni, al 2,6% delle 18enni e 19enni.

Figura I.1.33: Consumo di cocaina nella popolazione scolarizzata 15-19 anni (una o più volte negli ultimi 12 mesi). Distribuzione per genere e classi d'età

Maggior prevalenza
degli studenti
maschi che
consumano cocaina


Riduzione dei
consumi di cocaina
dal 2008



Fonte: Elaborazione su dati SPS-ITA 2010

Il trend del consumo di cocaina nell'ultimo anno dalla rilevazione, rilevato nei campioni intervistati, evidenzia un andamento al ribasso dal 2007, dopo una tendenza all'aumento nel triennio 2005-2007, ed un andamento stabile, sebbene con una certa variabilità nel periodo precedente al 2005.

Figura I.1.34: Consumo di cocaina nella popolazione scolarizzata 15-19 anni (almeno una volta negli ultimi 12 mesi). Anni 2000 - 2010



Fonte: Elaborazione sui dati ESPAD Italia 2000 – 2008, e dati SPS-ITA 2010


Tabella I.1.13: Consumo di cocaina nella popolazione scolarizzata 15-19 anni (almeno una volta negli ultimi 12 mesi). Confronto 2008 – 2010

Cocaina	Anno		Variazione 2008 vs 2010	
	2008	2010	valore assoluto	valore %
Maschi	4,6	3,8	0,8	-17,4
Femmine	2,6	2,0	0,6	-23,1
Totale	3,6	2,9	0,7	-19,4

Fonte: Elaborazione sui dati ESPAD Italia 2008 e SPS-ITA 2010

Tra gli studenti consumatori di cocaina durante l'ultimo anno, il 21% dei maschi ed il 14,5% delle femmine ha utilizzato la sostanza 20 o più volte, mentre per il 63% degli adolescenti maschi e per il 70% delle femmine si è trattato di un consumo occasionale (da 1 a 5 volte).

Figura I.1.35: Distribuzione della frequenza di utilizzo fra i consumatori di cocaina nella popolazione scolarizzata 15-19 anni (almeno una volta negli ultimi 12 mesi)



Tra i consumatori, maggiore presenza di consumo occasionale


Fonte: Elaborazione su dati SPS-ITA 2010

1.1.2.5 Consumo di cannabis

Il consumo di cannabis è stato sperimentato dal 22,3% degli studenti intervistati, quota che raggiunge il 18,5% se si considera il consumo annuale ed il 12,3% quando si fa riferimento agli ultimi 30 giorni (una o più volte).


Il consumo di cannabis almeno una volta nella vita da parte dei quindicenni e sedicenni italiani, intervistati nel 2010 risulta inferiore rispetto ai coetanei europei intervistati nel 2007, per entrambi i generi (14,0% vs 22,0% per i maschi e 9,5% vs 16,0% per le femmine).

Figura I.1.36: Consumo di cannabis nella popolazione scolarizzata 15-19 anni (una o più volte nella vita, negli ultimi 12 mesi, negli ultimi trenta giorni)



Fonte: Elaborazione su dati SPS-ITA 2010

Figura I.1.37: Consumo di cannabis nella popolazione scolarizzata 15-16 anni (una o più volte nella vita), per genere. Europa 2007, Italia 2010




Fonte: Elaborazione su dati ESPAD 2007 e SPS-ITA 2010

Il consumo di cannabis risulta direttamente correlato all'età dei soggetti: tra i maschi, le prevalenze di consumo passano dall'8,2% dei 15enni al 33,4% dei 19enni, mentre tra le studentesse si passa rispettivamente dal 5,8% al 21,7%.

Sia nel collettivo maschile che in quello femminile, le prevalenze dei consumatori aumentano progressivamente, soprattutto nel passaggio dai 15 ai 16 anni (16 anni: m=16,3%; f=10,7%) e dai 16 ai 17 anni (17 anni: m=24,8%; f=16,2%).

Figura I.1.38: Consumo di cannabis nella popolazione scolarizzata 15-19 anni (una o più volte negli ultimi 12 mesi). Distribuzione per genere e classi d'età




Maggior consumo
tra studenti 19enni:
33,4%

Aumento dei
consumi di cannabis
con il crescere
dell'età

Fonte: Elaborazione su dati SPS-ITA 2010

Il trend del consumo di cannabis negli ultimi 12 mesi, rilevato nei campioni intervistati nel 2010, indica una tendenza alla contrazione dei consumi più accentuata dal 2008 al 2010 rispetto al periodo 2002-2007, dopo una temporanea tendenza all'aumento registrata nel 2008. Dal 2005 si osserva un andamento uniforme tra gli adolescenti maschi e le femmine.


Figura I.1.39: Consumo di cannabis nella popolazione scolarizzata 15-19 anni (almeno una volta negli ultimi 12 mesi). Anni 2000 - 2010



Fonte: Elaborazione sui dati ESPAD Italia 2000 – 2008, e dati SPS-ITA 2010

Un andamento decrescente si riscontra anche nel trend del consumo di cannabis una o più volte nella vita tra gli studenti 15-16enni di alcuni Stati Membri dell'EU, tra cui l'Italia. Nei Paesi europei di Belgio, Bulgaria, Danimarca Germania, Irlanda, Slovenia e Italia, infatti, il consumo di cannabis è in contrazione dal 2003 al 2007, pur presentando prevalenze medio alte (20-25% tra i 15-16 anni) rispetto alla media europea.

Figura I.1.40 Consumo di cannabis nella popolazione scolarizzata 15-16 anni (una o più volte nella vita). Anni 1995 - 2007



Fonte: EMCDDA - Bollettino statistico 2009


Tabella I.1.14: Consumo di cannabis nella popolazione scolarizzata 15-19 anni (almeno una volta negli ultimi 12 mesi). Confronto 2008 – 2010

Cannabis	Anno		Variazione 2008 vs 2010	
	2008	2010	valore assoluto	valore %
Maschi	27,6	22,6	5,0	-18,1
Femmine	20,4	14,9	5,5	-27,0
Totale	24,2	18,5	5,7	-23,5

Fonte: Elaborazione sui dati ESPAD Italia 2008 e SPS-ITA 2010

Per quanto riguarda la frequenza di assunzione, in entrambi i generi prevale il consumo occasionale di cannabis, circoscritto a 1-5 volte nel corso dell'anno (f=54%; m=63%). Il 33% del collettivo maschile, contro il 23% di quello femminile, riferisce di aver utilizzato cannabis più assiduamente, 20 o più volte nei dodici mesi antecedenti l'indagine campionaria.

Figura I.1.41: Distribuzione della frequenza di utilizzo fra i consumatori di cannabis nella popolazione scolarizzata 15-19 anni (almeno una volta negli ultimi 12 mesi)




Fonte: Elaborazione su dati SPS-ITA 2010

I.1.2.6 Consumi di stimolanti

Il 4,7% della popolazione studentesca nazionale riferisce di aver provato sostanze stimolanti (amfetamine, ecstasy, ecc.) almeno una volta nella vita, mentre il 3,0% le ha utilizzate nel corso dell'ultimo anno. Il consumo recente di stimolanti nei 30 giorni antecedenti la compilazione del questionario è stato riferito dall'1,8% della popolazione studentesca nazionale. Rispetto alla rilevazione del 2008, si osserva un incremento nei consumi di stimolanti, in particolare evidenza il consumo negli ultimi 30 giorni.

Figura I.1.42: Consumo di stimolanti nella popolazione scolarizzata 15-19 anni (una o più volte nella vita, negli ultimi 12 mesi, negli ultimi trenta giorni)



Il 4,7% degli studenti 15-19 anni ha usato stimolanti almeno una volta nella vita

Lieve aumento dei consumi di stimolanti;


Il 95,3% degli studenti non ha mai assunto stimolanti, mentre il 4,7% ha usato stimolanti almeno una volta nella vita

L'1,8% l'ha consumata negli ultimi 30 giorni

Fonte: Elaborazione su dati SPS-ITA 2010

Distinguendo tra tipologia di sostanza psicoattiva stimolante, si osserva una percentuale omogenea di consumatori di ecstasy e di amfetamine. Come osservato nell'indagine sulla popolazione in generale, anche in quella studentesca 15-16enne, il consumo di stimolanti sembra essere meno diffuso in Italia rispetto alla media europea (ecstasy: 1,7% maschi italiani vs 4% maschi europei; 1,1% femmine italiane vs 3% femmine europee).

Figura I.1.43: Consumo di ecstasy e anfetamine nella popolazione scolarizzata 15-16 anni (una o più volte nella vita), per genere. Europa 2007, Italia 2010




Fonte: Elaborazione su dati ESPAD 2007 e SPS-ITA 2010

Le quote di consumatori di stimolanti di genere maschile aumentano al crescere dell'età dei soggetti, ad eccezione dei 18enni che in termini percentuali consumano un po' meno dei 17enni. La prevalenza di consumo tra i maschi passa dal 2,1% 15enni al 4,5% dei 17enni e al 7,3% dei 19enni.

Tra le studentesse, si osserva un aumento nella fascia di età minore tra i 15 e i 16 anni, con prevalenze di consumo che variano dall'1,3% al 2,1%, per poi stabilizzarsi attorno all'1,6% e all'1,7% rispettivamente per le 18enni e le 19enni.


Figura I.1.44: Consumo di stimolanti nella popolazione scolarizzata 15-19 anni (una o più volte negli ultimi 12 mesi). Distribuzione per genere e classi d'età



Fonte: Elaborazione su dati SPS-ITA 2010

Il trend del consumo di stimolanti negli ultimi 12 mesi rilevato nel campione intervistato nel 2010 indica un andamento contrapposto tra i generi: aumento tra i maschi e contrazione dei consumi tra le femmine. decremento nei consumi per entrambi i generi. Questa variazione riscontrata nell'ultimo anno dovrà essere verificata mediante l'analisi congiunta di altre fonti informative. Se tale variazione verrà validata e confermata anche nei prossimi anni, potrebbe evidenziare un cambiamento nel profilo del consumo di sostanze nella popolazione scolarizzata.

Figura I.1.45: Consumo di stimolanti nella popolazione scolarizzata 15-19 anni (almeno una volta negli ultimi 12 mesi). Anni 2003 - 2010



Fonte: Elaborazione sui dati ESPAD Italia 2000 – 2008, e dati SPS-ITA 2010

Maggior consumo
tra gli studenti
maschi 19 anni:
7,3%

Nel 2010 aumento
del consumo di
stimolanti tra i
maschi e riduzione
dei consumi tra le
femmine


Tabella I.1.15: Consumo di stimolanti nella popolazione scolarizzata 15-19 anni (almeno una volta negli ultimi 12 mesi). Confronto 2008 – 2010

Stimolanti	Anno		Variazione 2008 vs 2010	
	2008	2010	valore assoluto	valore %
Maschi	3,6	4,6	1,0	+27,8
Femmine	2,0	1,6	0,4	-20,0
Totale	2,8	3,0	0,2	+7,1

Fonte: Elaborazione sui dati ESPAD Italia 2008 e SPS-ITA 2010

Tra gli studenti intervistati consumatori di sostanze stimolanti, il 60% dei maschi ed il 65% delle femmine riferisce di aver utilizzato queste sostanze da 1 a 5 volte negli ultimi 12 mesi. Il consumo più assiduo di stimolanti (20 o più volte annualmente) è stato riferito rispettivamente dal 28% e dal 23% della popolazione studentesca maschile e femminile.

Figura I.1.46: Distribuzione della frequenza di utilizzo fra i consumatori di stimolanti nella popolazione generale 15-19 anni (almeno una volta negli ultimi 12 mesi)




Fonte: Elaborazione su dati SPS-ITA 2010

I.1.2.7 Consumi di allucinogeni

Tra gli studenti italiani, il 3,5% ed il 2,2% ha riferito di aver usato sostanze allucinogene rispettivamente almeno una volta nella vita ed almeno una volta nell'ultimo anno precedente all'intervista, mentre l'1,1% ha riportato di averne consumato recentemente (nel corso degli ultimi 30 giorni). Sensibili differenze rispetto alla rilevazione del 2008, si osservano nel consumo di allucinogeni almeno una volta nella vita (-25,5%) e negli ultimi 12 mesi (-24,1%).

Figura I.1.47: Consumo di allucinogeni nella popolazione scolarizzata 15-19 anni (una o più volte nella vita, negli ultimi 12 mesi, negli ultimi trenta giorni)




Fonte: Elaborazione su dati SPS-ITA 2010

All'interno della popolazione studentesca nazionale, le prevalenze d'uso di sostanze allucinogene negli adolescenti di genere maschile, aumentano al passaggio da un'età alla successiva, ad eccezione dei 18enni, età in cui si riscontra una restrizione nei consumi. Le studentesse consumatrici di allucinogeni aumentano con il crescere dell'età, da 0,6% nelle 15enni all'1,6% tra le 19enni, con un picco massimo osservato nelle 16enni (1,6%).

Maggior uso tra studenti maschi 19 anni: 5,2%

Figura I.1.48: Consumo di allucinogeni nella popolazione scolarizzata 15-19 anni (una o più volte negli ultimi 12 mesi). Distribuzione per genere e classi d'età




Fonte: Elaborazione su dati SPS-ITA 2010

Secondo le indicazioni rilevate dagli studenti intervistati dal 2003 al 2010, ad eccezione del 2009 anno in cui non è stata eseguita la rilevazione, sembra delinearsi un andamento crescente dal 2005 al 2008, in seguito al quale si assiste ad una contrazione dei consumi di allucinogeni per entrambi i generi della popolazione scolarizzata, in percentuale più elevata tra le studentesse (-35,5%).

Consumi in diminuzione dal 2008

Figura I.1.49: Consumo di allucinogeni nella popolazione scolarizzata 15-19 anni (almeno una volta negli ultimi 12 mesi). Anni 2003 - 2010



Fonte: Elaborazione sui dati ESPAD Italia 2000 – 2008, e dati SPS-ITA 2010


Tabella I.1.16: Consumo di allucinogeni nella popolazione scolarizzata 15-19 anni (almeno una volta negli ultimi 12 mesi). Confronto 2008 – 2010

Allucinogeni	Anno	Variazione 2008 vs 2010	
Genere	2008	2010	valore assoluto
Maschi	3,8	3,2	0,6
Femmine	2,0	1,3	0,7
Totale	2,9	2,2	0,7
			-24,1

Fonte: Elaborazione sui dati ESPAD Italia 2008 e SPS-ITA 2010

Tra gli studenti consumatori di allucinogeni, il 64% dei maschi ed il 72% delle femmine ne ha fatto uso da 1 a 5 volte nel corso dell'ultimo anno, mentre il consumo più frequente (20 o più volte nel corso di 12 mesi) è stato riferito dal 23% e dal 17% rispettivamente degli studenti e delle studentesse.

Figura I.1.50: Distribuzione della frequenza di utilizzo fra i consumatori di stimolanti nella popolazione generale 15-19 anni (almeno una volta negli ultimi 12 mesi)



Fonte: Elaborazione su dati SPS-ITA 2010

I.1.2.8 Policonsumo nella fascia 15-19

La poliassunzione di sostanze psicoattive, legali ed illegali, caratterizza e definisce lo stile di consumo prevalente sempre più diffuso tra soggetti più giovani.

La Tabella I.1.16 rappresenta la distribuzione di prevalenza condizionata d'uso di sostanze legali ed illegali tra coloro che riferiscono di aver consumato sostanze illegali negli ultimi dodici mesi.

Il 18,5% degli studenti riferisce di aver consumato cannabis nell'ultimo anno, tra questi il 98,6% ha bevuto alcolici nello stesso periodo, il 96,2% ha fumato almeno una sigaretta al giorno, il 16,6% ha usato cocaina e il 5,4% eroina.

Degli studenti intervistati il 2,9% ha riferito l'uso di cocaina negli ultimi dodici mesi. Tra i consumatori di cocaina, l'uso di alcol negli ultimi dodici mesi è attribuibile al 98% dei soggetti, mentre, il 94,5% riferisce di fumare quotidianamente sigarette, il 96% ha fatto uso anche di cannabis (per la quasi totalità dei soggetti si registra anche l'uso di tale sostanza) e il 27% di eroina.


Lo 0,8% ha riferito di aver fatto uso almeno una volta negli ultimi dodici mesi di eroina. Il 97,6% dei consumatori della sostanza ha consumato nello stesso periodo alcolici, l'89,3% ha fumato quotidianamente, il 96% ha usato cannabis e l'84,9% cocaina. Questi risultati evidenziano che i consumatori di eroina come sostanza primaria, assumono in percentuale maggiore anche cocaina, rispetto ai consumatori di cocaina come sostanza primaria, che ricorrono al consumo congiunto di eroina in percentuale inferiore.

Tabella I.1.17: Distribuzione della prevalenza condizionata di policonsumatori nella popolazione scolarizzata 15-19 anni negli ultimi 12 mesi (last year prevalence)

Sostanze	Alcol	Tabacco (≥ sigaretta/die)	Cannabis	Cocaina	Eroina
Cannabis	98,6	96,2	-	16,6	5,4
Cocaina	98,2	94,5	96,0	-	27,0
Eroina	97,6	89,3	95,9	84,9	-

Fonte: Elaborazione su dati SPS-ITA 2010

Figura I.1.51: Poliassunzione (dati SPS-ITA - età 15 – 19 anni)



Fonte: Elaborazione su dati SPS-ITA 2010

Forte tendenza al policonsumo:

- Forte associazione con alcol e tabacco di tutte le sostanze
 - Consumatori di cannabis: 17% anche cocaina 5% anche eroina
 - Consumatori di cocaina: 96% anche cannabis 27% anche eroina
 - Consumatori di eroina 96% anche cannabis 85% anche cocaina

Cannabis si conferma come droga “trasversale”

I.1.3. Consumo di alcol

A conclusione dell'analisi sui consumi di sostanze illecite nella popolazione generale e studentesca ed in relazione all'elevato consumo di alcol in associazione con le sostanze stupefacenti osservato nei paragrafi precedenti, di particolare interesse risulta il confronto tra l'andamento dei consumi di sostanze illecite ed il trend dell'uso ed abuso di alcol nell'ultimo periodo.

A tal fine sono stati considerati i dati prodotti dallo studio ESPAD 2007 sul consumo di alcolici negli studenti 17-18 anni, pubblicati nel Rapporto "Epidemiologia e monitoraggio alcol-correlato in Italia"- ISTISAN 10/5 del 2010.

Tabella I.1.18: Consumo di alcol dei giovani italiani di 17-18 anni. Anni 2007 e 2010

	2007			2010			Δ%		
	M	F	TOT	M	F	TOT	M	F	TOT
Consumo % alcol nella vita									
mai	9	12	10	7	10	8	-22,2	-16,7	-20,0
da 1 a 9 volte	30	42	35	17	30	24	-43,3	-28,6	-31,4
da 10 a 39 volte	31	30	31	25	32	29	-19,4	6,7	-6,5
oltre 40 volte	30	16	23	52	28	39	73,3	75,0	69,6
Consumo % alcol negli ultimi 12 mesi									
mai	16	21	19	9	14	12	-43,8	-33,3	-36,8
da 1 a 9 volte	44	50	48	33	48	41	-25,0	-4,0	-14,6
da 10 a 39 volte	28	23	25	34	29	31	21,4	26,1	24,0
oltre 40 volte	12	5	8	24	9	16	100,0	80,0	100,0
Consumo % alcol negli ultimi 30 giorni									
mai	31	42	37	15	25	20	-51,6	-40,5	-45,9
da 1 a 9 volte	51	49	50	63	66	64	23,5	34,7	28,0
da 10 a 39 volte	15	8	11	18	8	13	20,0	0,0	18,2
oltre 40 volte	3	1	2	4	1	2	33,3	0,0	21,5
Ubriacature nella vita (%)									
mai	61	63	62	33	46	40	-45,9	-27,0	-35,5
da 1 a 9 volte	31	33	32	49	45	47	58,1	36,4	46,9
da 10 a 39 volte	6	3	5	13	8	10	116,7	166,7	100,0
oltre 40 volte	1	1	1	5	2	3	400,0	100,0	200,0

Fonte: *Elaborazioni Osservatorio Nazionale Alcol CNESPS su dati ESPAD 2007, Studio SPS-ITA 2010 – Dipartimento Politiche Antidroga*

Secondo i dati ESPAD 2007, il 90% del campione di popolazione giovanile italiana di età compresa tra i 17 e i 18 anni ha dichiarato di aver consumato alcol almeno una volta nel corso della vita (quasi un adolescente su 4 ha dichiarato di averlo consumato oltre 40 volte), mentre l'81% l'ha consumato anche nel corso dei dodici mesi antecedenti la rilevazione. Il consumo nel corso degli ultimi trenta giorni ha coinvolto il 63% degli studenti italiani (69% dei maschi e 58% delle femmine). Il 38% dei giovani ha riferito di essersi ubriacato almeno una volta nel corso della vita; il 32% lo ha fatto da 1 a 9 volte senza evidenti differenze di genere.

Nel corso dell'anno 2010, il 92% degli studenti italiani ha dichiarato di aver consumato alcol almeno una volta nella vita (più di un adolescente su 3 ha dichiarato di averlo consumato oltre 40 volte) ed l'88% ha riferito di averlo consumato nel corso dell'ultimo anno. Il consumo recente di bevande alcoliche, riferito ai 30 giorni antecedenti la somministrazione del questionario è stato dichiarato dall'80% degli studenti (85% dei maschi e 75% delle femmine).

Ben il 60% degli studenti si è ubriacato almeno una volta nella vita (67% dei

Aumento % dal
2008 al 2009 del
consumo quotidiano
del 18,2%

Aumento % dal
2008 al 2009 delle
ubriacature oltre 40
volte nella vita del
200%

Consumo di alcol
nel 2007:
- 90% almeno una
volta nella vita
- 81% negli ultimi
12 mesi
- 63% negli ultimi
30 gg

Consumo di alcol
nel 2009:
- 92% almeno una
volta nella vita
- 88% negli ultimi
12 mesi
- 80% negli ultimi
30 gg